



Ⅰ. 医薬品の採用・削除のお知らせ

1. 7月 薬品・治療材料等審査委員会の結果(医薬品名をクリックすると添付文書が確認できます)

◎新規採用医薬品

薬品名・規格 (一般名)	販売会社 薬価(円)	効能・適応 疾患	診療科 申請医長	申請理由、薬品の特徴など
ロンサーフ配合錠T 15・20 (トリフルジン /チピラシル塩酸塩)	大鵬 2489.6/15mg 3340.9/20mg	抗悪性腫瘍剤	外科 松下医長	・5-FU系抗癌剤に抵抗性を示す腫瘍に対しても抗腫瘍効果が認められた ・朝食後及び夕食後の1日2回経口投与の製剤
テルモ生食 100mLソフトバッグ (塩化ナトリウム)	テルモ 113/袋	電解質輸液製剤	薬剤科 田中医長	・現在、生食100mLプラボトル容器が採用されており、点滴の際にエア針が必要である。抗がん剤等被曝の危険性がある注射は、閉鎖性の保たれる方が望ましい。ソフトバッグにすることでエア針を必要とせず危険が軽減される ・ 大塚生食注100mLと切り替え
インライタ錠5mg (アキシチニブ)	ファイザー 9354.2/錠	抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤	泌尿器科 岩村医長	・VEGFR-1、-2 及び-3 をターゲットとした選択的キナーゼ阻害剤 ・既治療の転移性腎細胞癌患者に対する有用性が認められている
ゴナックス皮下注用 80mg・120mg (デガレリクス酢酸塩)	アステラス 24,370/80mg 29,958/120mg	GnRHアンタゴニスト (徐放性) ／前立腺癌治療剤	泌尿器科 岩村医長	・テストステロンを直ちに低下させ、速やかに去勢レベルに到達させる ・PSAを直ちに低下させ、再燃までの期間を延長させる
カドサイラ点滴静注 100mg・160mg (トラスツマブ・エムタンシン (遺伝子組換え)注T-DM1)	中外 235,108/100mg 373,945/160mg	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体	外科 松下医長	・HER2 陽性乳癌細胞に対して選択的に作用し、トラスツマブによる抗腫瘍効果と、DM1 による細胞傷害活性を併せ持つ ・治療歴のあるHER2 陽性進行・再発乳癌にも奏功した

◎患者限定購入医薬品

薬品名・規格 (一般名)	販売会社 薬価(円)	効能・適応 疾患	診療科 申請医長	申請理由、薬品の特徴など
イクスタンジカプセル40mg (エンザルタミド)	アステラス 3138.8/cap	前立腺癌治療剤	泌尿器科 岩村医長	・アンドロゲン受容体 (AR) のシグナル伝達阻害作用を有する新規抗アンドロゲン剤 ・ドセタキセルを含む化学療法施行後に病勢進行が認められた去勢抵抗性前立腺癌患者の生存期間が延長
ヴォトリエント錠200mg (パゾパニブ塩酸塩)	グラク 4142.3/錠	抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤	泌尿器科 岩村医長	・悪性軟部腫瘍に対する初めての分子標的治療薬である ・1 日1 回の経口投与で治療が可能である
リーマス錠100 (炭酸リチウム)	大正富山 12.7/錠	躁病・躁状態治療剤	救急診療科 磯部医長	・躁状態の高揚や興奮に対して特異的な情動安定化作用を有する ・本剤の投与により、病相期の発現を消失または減少させる

◎院外専用医薬品

薬品名・規格 (一般名)	販売会社 薬価(円)	効能・適応 疾患	診療科 申請医長	申請理由、薬品の特徴など
モディオダール錠100mg (モダフィニル)	田辺三菱 404.2/錠	精神神経用剤	脳神経外科 織田医長	・視床下部に選択的に作用し、覚醒を促進する ・1 日1 回投与で効果が持続する
フォシーガ錠5mg (ダパグリフロジン プロピレングリコール)	アリスト・マヤース 205.5/錠	選択的SGLT2阻害剤 2型糖尿病治療剤	内科 畑尾医長	・SGLT2に対して高い選択性を示す ・食事の影響を受けないことから食前・食後のいずれでも投与可能である